

หูดข้าวสุก

Molluscum
contagiosum



สาเหตุ

หูดข้าวสุกเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนัง แต่เป็นเชื้อไวรัสคนละชนิดกับที่ทำให้เกิดหูดทั่วไป เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดหูดข้าวสุกนี้ สามารถเข้าทางผิวหนังที่เป็นแผล และเกิดเป็นหูดข้าวสุก แล้วติดต่อและแพร่กระจายจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งได้จากการสัมผัส



อาการ

มักพบหูดข้าวสุกในเด็ก มีลักษณะเป็นตุ่มใสขนาดเล็กมีสีเนื้อ รูปโดม เป็นทลุมตรงกลาง พบบ่อยบริเวณแขน รักแร้ ขาหนีบ และบริเวณใบหน้า มักพบบริเวณที่สัมผัสหรือเสียดสีกัน เช่น ข้อพับแขน รักแร้ ขาหนีบ อากาศร้อนและความชื้นสูงจะทำให้เป็นมากขึ้น เนื่องจากไวรัสสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ถ้าไปแกะเกาจะมีอาการบวม แดง อักเสบ เป็นหนองได้



การติดต่อ

หูดข้าวสุกสามารถติดต่อโดยการสัมผัสทางผิวหนังจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง หรือจากผิวหนังที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งในบุคคลเดียวกัน ในเด็กเล็กอาจติดต่อในพื้นที่ห้องครัวเดียวกัน หรือติดต่อระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียนหรือผู้ที่ใช้สระน้ำร่วมกัน เด็กเล็กจะสามารถติดหูดได้มากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่ หรือผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ ซึ่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่องจะไวต่อการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้มากกว่าบุคคลทั่วไป

