

### การป้องกันและการปฏิบัติตน

#### รักษาความสะอาดของร่างกาย ดังนี้

- สระผมให้สะอาด ผู้ที่ตัดผมสั้นหรือโกนผม ต้องทำความสะอาดเครื่องมือ เช่น กรรไกรหรือมีดโกน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำไปใช้กับผู้อื่นต่อไป
- หลังจากทำงานออกกำลังกายที่มีเหงื่อออกมาก ควรอาบน้ำให้สะอาดและเช็ดตัวให้แห้ง เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่
- เสื้อผ้าที่จะนำมาสวมใส่ต้องซักและผึ่งแดดให้แห้ง
- ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าทึบ ควรซักให้สะอาดและผึ่งแดดให้แห้งเสมอ
- ไม่ควรใช้เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า ปรอบนกับบุคคลอื่น เมื่อใช้แล้วซักให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้ง รองเท้าที่เปียกชื้นควรผึ่งให้แห้ง
- ควรล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดให้แห้งภายหลังย่ำน้ำสกปรก หรือหลังจากการใส่ถุงเท้า รองเท้าต่างๆ ควรเลือกใส่รองเท้าโปร่ง ขณะอากาศร้อนหรือขณะเป็นโรคกลาก
- ผู้ที่มีเชื้อกลากบนศีรษะไม่ควรย้อมผมหรือตัดผมจนยาว จะหายดี

#### ข้อแนะนำ

วงแดงที่ผิวหนังหรือเล็บที่ผิดปกติ ไม่ใช่เป็นเชื้อราเสมอไป ควรให้แพทย์ตรวจ และชุดเชื้อเพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอน ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง เนื่องจากยาซื้อบางชนิด อาจเป็นพิษต่อตับได้

### แผนที่สถาบันโรคผิวหนัง




รถประจำทางที่ผ่านหน้าสถาบันโรคผิวหนัง  
สาย 8, 12, 14, 18, 28, 92, 97, 108, 116  
ปอ.509, 510, 515, 524, ปอ.พ.4, 8

#### งานสุศึกษาและเผยแพร่ สถาบันโรคผิวหนัง

420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0 2354 8036-40 โทรสาร : 0 2354 8042  
[www.inderm.go.th](http://www.inderm.go.th)

# กลาก (Tinea)




สถาบันโรคผิวหนัง  
กรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข

# กลาก (Tinea)

### สาเหตุ

**กลาก** เป็นโรคเชื้อราที่ผิวหนัง พบได้บ่อยใน  
ประเทศที่มีอากาศร้อนและความชื้นสูง เช่น ประเทศไทย

**กลาก** เป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย พบมากในคนอ้วน  
ผู้ที่มีเหงื่อออกมาก ใส่เสื้อผ้าที่หนักรวม เชื้อราชนิดนี้มีอยู่ทั่วไป  
ตามพื้นดิน สามารถทำให้เกิดโรคได้ทั้งคนและสัตว์ คนสามารถ  
ติดเชื้อได้จากพื้นดิน หรือจากการสัมผัสกับสัตว์และคนที่ป่วยโรค  
เกิดได้กับทุกส่วนของร่างกาย แต่พบบ่อยบริเวณอับชื้น เช่น  
ขาหนีบ



### อาการ

ลักษณะเป็นผื่นรูปวงแหวน เมื่อใช้เล็บขูดจะลอกเป็นขุย  
มีอาการคัน มีวงเดียวหรือหลายวง มักลุกลามมีขนาดกว้างขึ้นเรื่อยๆ  
อาจมีตุ่มแดงหรือตุ่มน้ำพุพองร่วมด้วย

กลาก เกิดขึ้นบริเวณต่างๆ ของร่างกายที่สัมผัสกับเชื้อ  
ได้แก่

- **กลากที่หน้า หู แขน ขา รักแร้ ใต้ราวนม ขาหนีบ และก้น**  
ผื่นจะเป็นวงแดง มักเริ่มจากขนาดเล็ก แล้วขยายวงกว้างออก  
ขอบของวงแดง จะมีขุยขาว
- **กลากที่หนังศีรษะ** มีภาพในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ หนังศีรษะ  
ที่มีการติดเชื้อจะเป็นวงแดง มีเส้นผมหักและขุยขาวๆ อาจจะมี  
หนองและมีสะเก็ด
- **กลากที่ซอกเท้า** จะมีขุยขาว คัน ผิวหนังบริเวณที่ซอกนิ้ว  
เปื่อยยุ่ย หรือเป็นตุ่มน้ำใสเล็กๆ บริเวณฝ่าเท้า

### การรักษา

ยาทา ได้แก่ ซีมีนังวิทิลด์, คลอไตรมาโซลครีม,  
ไมโคนาโซลครีม หรือคีโตโคนาโซลครีม ใช้ทาบริเวณที่เป็น  
วันละ 2 ครั้ง หลังอาบน้ำ ต่อเนื่องนาน 2 - 4 สัปดาห์ กลากที่  
หนังศีรษะ ฆ่าเชื้อฆ่าเท้า ทาติดต่อกันอย่างน้อย 6 - 8 สัปดาห์

**ยารับประทาน** ได้แก่ กริซโอฟลูวินรับประทานติดต่อกัน  
กันนาน 4 สัปดาห์ สำหรับกลากที่ศีรษะ ต้องให้ยาต่อเนื่องนาน  
6 - 8 สัปดาห์ หรือใช้ยาตามแพทย์สั่งจนกว่าจะหาย หากไม่  
ตอบสนองต่อกริซโอฟลูวินหรือแพ้ยาให้ใช้ยาตัวอื่นๆ ได้แก่  
คีโตโคนาโซล, อีคตราโคนาโซล หรือเทอบินาฟีน ผู้ที่เป็นโรค  
กลากควรรักษาอย่างต่อเนื่อง และใช้ยาตามที่แพทย์สั่งจนกว่า  
จะหายเป็นปกติ

#### การใช้ยาควรปฏิบัติ ดังนี้

- ทายาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่ง

- ถึงแม้บริเวณรอยโรคจะหาย ควรทายา  
หรือรับประทานยาให้ครบตามแพทย์สั่ง เพื่อฆ่าเชื้อ  
ให้หมดและมาตรวจตามนัด